

เมื่อถูกสุนัขหรือแมว กัด ข่วน ต้องทำดังนี้


1. **รีบล้างแผลให้เร็วที่สุด**ด้วยน้ำและสบู่หลายๆ ครั้ง ให้ถึงก้นแผล ล้างสบู่ออกให้หมด เช็ดแผลให้แห้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อรักษาแผลสด
2. **จดจำสัตว์ที่กัดให้ได้เพื่อสืบหาเจ้าของ/กักสัตว์ไว้ดูอาการ 10 วัน** สอบถามประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
3. **ไปหาหมอหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข** เพื่อรับการป้องกันที่ถูกต้อง

คำแนะนำสำหรับคนเลี้ยงสุนัข

1. **นำสุนัขไปฉีดวัคซีน**ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า**ทุกปี** (ปีแรกควรฉีด 2 ครั้ง)
2. **ไม่ปล่อยสุนัขไปเพ่นพ่านในที่สาธารณะ** ทุกครั้งที่นำสุนัขออกนอกบ้าน ต้องอยู่ในสายจูง
3. **ไม่นำสุนัขไปปล่อย** และต้องคุมกำเนิดไม่ให้มีสุนัขมากเกินไป







"ปีหนึ่งคนไทยถูกสุนัขกัด ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน"

เมื่อถูกสัตว์สงสัยป่วย ด้วยโรคพิษสุนัขบ้ากัดหรือข่วน

ต้องล้างแผล ใส่ยา กักหมา 10 วัน และหาหมอ

Get it on Google play | Available on the App Store

กด ดู รู้ โรค

สำนักโรคติดต่อทั่วไป

http://thaigcd.ddc.moph.go.th

DDC 1422 สายด่วนกรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

กรมควบคุมโรค Department of Disease Control



โรค พิษสุนัขบ้า





โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ เกิดจากเชื้อไวรัสเรบี่ส์ เป็นได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น ชะนี กระรอก กระแต แต่พบมากที่สุดในสุนัข และรองลงมาคือ แมว

คนหรือสัตว์จะติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้ เมื่อถูกสัตว์ที่เป็นโรคนี้กัดหรือข่วน หรือน้ำลายสัมผัสกับบาดแผล เยื่อบุตา เยื่อบุจมูก เยื่อบุปาก เช่นถูกเลีย หรือน้ำลายกระเด็น โดยเชื้อจะอยู่ในน้ำลาย ถ้าเป็นสุนัขและแมว จะพบว่ามีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ออกมากับน้ำลาย ตั้งแต่ก่อนแสดงอาการ 1-7 วัน



อาการที่พบในคน

ส่วนใหญ่ระยะฟักตัวของโรค ตั้งแต่ 3 สัปดาห์ – 6 เดือน แต่บางรายมีระยะฟักตัวสั้นมาก ไม่ถึงสัปดาห์ หรืออาจนานเกิน 1 ปี **อาการเริ่มแรก** คือ เบื่ออาหาร เจ็บคอ มีไข้ อ่อนเพลีย มีอาการคันรุนแรงบริเวณที่ถูกกัด แล้วลามไปส่วนอื่น กระสับกระส่าย กลัวแสง กลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง เพ้อเจ้อ กลืนลำบาก โดยเฉพาะของเหลว กลัวน้ำ ปวดท้องน้อยและขา กล้ามเนื้อกระตุก แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก เกร็ง อัมพาต หมดสติ และตายในที่สุด





อาการที่พบในสุนัข

ระยะฟักตัวของโรคหลังจากถูกกัดหรือข่วน จะอยู่ในช่วง 3-8 สัปดาห์ ไม่เกิน 6 เดือน และ**จะตายภายใน 10 วัน หลังจากแสดงอาการ** ซึ่งมีทั้งแบบดุร้าย และแบบซึม โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ

ระยะแรก

สุนัขจะมีอารมณ์และนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม

ระยะตื่นเต้น

สุนัขเริ่มมีอาการทางประสาท กระวนกระวาย ตื่นเต้น หงุดหงิด ไม่อยู่นิ่ง กัดแทะสิ่งของไม่เลือก ม่านตาขยายกว้าง

ระยะอัมพาต

สุนัขมีอาการหางตก ลิ้นมีสีแดงคล้ำห้อยออกนอกปาก น้ำลายไหล ขย้อนอาหารคล้ายมีอะไรอยู่ในลำคอ ขาอ่อนเปลี้ย ทรงตัวไม่ได้ล้มลง อัมพาตทั้งตัวอย่างรวดเร็วและตายในที่สุด

คาถา 5 ย กันสุนัขกัด



ย1 อย่าแหย่ สุนัขให้โมโห

ย2 อย่าเหยียบ หาง หัว ตัว ขา หรือ ทำให้สุนัขตกใจ





ย3 อย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า

ย4 อย่าหยิบ จานข้าว หรือเคลื่อนย้าย อาหาร ขณะสุนัขกำลังกินอาหาร





ย5 อย่ายุ่งหรือเข้าใกล้สุนัขที่ไม่รู้จักหรือไม่มีเจ้าของ